


DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Teste de Widal



Coprocultivo



Tratamento

A febre tifóide deve ser tratada com antibióticos específicos.

Pacientes com vômito e diarreia por mais de um dia podem receber soro oral ou injectável para reidratar.

PREVENÇÃO

- Ferver água para beber, desinfetar com cloro, filtrar ou comprar água engarrafada.
- Lavar as mãos com água e sabão depois de utilizar a casa de banho e antes de comer ou preparar alimentos.
- Lavar bem as frutas e legumes.
- Cozinhar bem os alimentos .
- Não consuma alimentos em lugares duvidosos.
- Não defecar ou urinar em poços, rios, lagoas ou campos cultivados.
- Eliminar o lixo adequadamente.
- Evitar proliferação de vectores.



Instituto Nacional da Saúde Pública
Rua: Amílcar Cabral 96, Maianga - Luanda 2017
Email: geral@insp.co.ao
insp.minsa@gmail.com
Tel:222393247/222395881
Fax:392911



República de Angola
Ministério da Saúde
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

FEBRE TIFÓIDE



PRINCIPAIS SINTOMAS

- Febres altas, dor de cabeça.
- Dores abdominais.
- Diarreias.
- Vômitos.
- Sangue nas fezes.
- Humor instável.
- Calafrios.
- Manchas rosadas na barriga.
- Mal estar em geral.



IMPORTANTE...

- A morte acontece em 10-30 % em casos não tratados atempadamente.
- Reduz a 1 % se os casos forem tratados na primeira ou segunda semana.
- **A infecção afecta crianças e adultos.**

Se estiver em presença de alguns destes sintomas procure ajuda médica.

UM PROBLEMA DE SAÚDE SÉRIO

É uma doença infecto - contagiosa causada pela ingestão da bactéria *Salmonella typhi* em alimentos ou água contaminados por fezes humanas.

- **Pode ser mortal se não for tratada oportunamente.**
- **É uma doença endémica em Angola.**

MODO DE TRANSMISSÃO

- Fecal oral
- De pessoa a pessoa
- A *Salmonella* pode ser transportada por **moscas** para a comida e bebida.



- Contacto de alimentos e bebida com águas contaminadas com fezes.
- Os convalescentes de febre tifoide e os portadores assintomáticos podem transmitir a doença durante um período relativamente longo, que pode durar dois anos ou mais.