

PARTO ESPECIALIZADO

Implementação da Nevirapina, no recém-nascido logo após ao nascimento.

O bebé deve voltar a ser testado aos 6 meses de vida, se for infestado e acompanhado pelo médico infeciologista.

As crianças infestadas pelo HIV devem ser seguidas durante toda vida.

Tratamento - Antirretrovirais



Boa alimentação



Fazer exercícios físico.



MITOS E VERDADES

Falso - Em geral, a via de parto mais indicado para a mulher com HIV é a cesárea.

Falso - Uma pessoa que toma anti-retroviral, pode parar de tomar a medicação se sentir-se bem.

Falso - O HIV pode ser curado com medicamentos tradicionais.

Verdade - É possível ter um parto normal, quando a carga viral é inferior a 1.000 cópias/ml. A mulher recebe o anti-retroviral durante o parto ou antes do parto. O recém-nascido toma um xarope anti-retroviral desde o nascimento até a sexta semana de vida.

Verdade - Durante a gravidez a possibilidade de transmissão do HIV da mãe para o bebé é de 20%, quando a mãe não é seguida pelo médico e não está inserida nos programas de PTV. Mas quando a mãe está no programa e cumpre toda recomendação médica esta possibilidade baixa para valores inferior a 1%.



Instituto Nacional da Saúde Pública
Rua: Amílcar Cabral 96, Maianga - Luanda 2017
Email: geral@insp.co.ao
insp.minsa@gmail.com
Tel:222393247/222395881
Fax:392911



República de Angola
Ministério da Saúde
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

Transmissão vertical por VIH



O QUE É O HIV?

HIV - SIDA é uma doença do sistema imunológico humano, causado pelo vírus da imunodeficiência humana.

Pode ser transmitido da mãe para o filho de pelo cordão umbilical.

ALGUMAS MANIFESTAÇÕES DA DOENÇA NA MÃE:

Febre, Cansaço.

Falta de apetite, Gripe (dor de garganta).

Aparecimento de gânglios linfáticos.

Aparecimento de gânglios linfáticos.
Falta de apetite.

MANIFESTAÇÕES EM BEBÊS:

- Febre prolongada.
- Parotidite crónica.
- Desnutrição.
- Pneumonias de repetição.
- Moníliase de repetição.
- Diarréica crónica.
- Hepatomegalia (aumento do fígado).
- Esplenomegalia (aumento do baço).



COMO SE TRANSMITE?

Durante a gravidez ocorre pela placenta.

Transmissão Vertical



De mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação



Durante o parto



Durante a amamentação



Mas este risco pode ser controlado quando a mãe seropositivo começa a fazer tratamento com anti-retrovirais.

COMO PREVENIR A TRANSMISSÃO VERTICAL?

A Mãe Gestante deve:

Fazer testagem serológica precoce do HIV.
"No período pré-natal".



Buscar tratamento, acompanhamento e aconselhamento nas Salas do (PTV).

PARTO ESPECIALIZADO

- A mãe HIV+, sob conselho médico deve tomar anti-retroviral na altura do parto.
- As crianças expostas ao HIV, devem ser testadas dentro das primeiras 24h de vida.